

ウイルス除去除菌スプレー

バリアサーティ™



ウイルス除去効果
約1ヶ月持続！*1

ウイルス・菌を即効除去！*2

*本品は医薬品・医薬部外品ではありません。
 *使用環境によって効果の持続時間に差があります。
 *全てのウイルス・菌に効果があるわけではありません。
 *1 テーブル試験で実証済。バリアサーティ™をフィルムにスプレー後、乾燥させる。
 1ヶ月後、フィルム表面にウイルス液を接触させたのち、ブランク法にて評価。
 *2 約30秒で99.9%のウイルス・菌を除去。
 ウイルス除去効果の判定：試験管にバリアサーティ™とウイルス液を入れ、30秒接触させたのち、ブランク法にて評価。
 除菌効果の判定：試験試料に試験菌液をそれぞれ100μLずつ接種し25℃で培養した物より生菌数を測定。

ウイルス除去成分を配合。

アルコールの含有でさらに除菌効果も
 プラスしたW効果のスプレーです。

効果・効能対照表

※全てのウイルス・菌に
 効果があるわけでは
 ありません。

項目	ウイルス		菌
	エンベロープ有	エンベロープ無	—
即効性	○	×	○
1ヶ月持続	○	×	×

よく手が触れる場所にシュッとスプレー、サッとひと拭き！



ドアノブに



机に



スイッチに



リモコン等に

よく手が触れる場所等は効果の持続時間に差があります。よく手が触れる部分には定期的にもスプレーしてください。水ふきした場合は、再度スプレーしてください。

バリアサーティ™の使用法


約10cm離してスプレーし、
 乾かしてください。

電気製品には直接スプレーせず
 乾いた布などにスプレーして、
 塗布してください。



使用の目安として100cm²あたり
 1~2秒スプレーしてください。

乾燥後、ムラがある場合は
 再度スプレーし、乾く前に布などで
 均一に塗り広げてください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ってください。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。高圧ガス：DME

規格

アズワン品番	内容量	標準価格(税別)
65-1923-60	100mL×6本	9,000円 (1,500円×6本)



使用上の注意

●ウイルス除去や除菌の用途以外には使用しないでください。 ●人体に使用しないでください。直接吸入しないように注意してください。 ●本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方(アレルギー等)はご使用時、注意してください。 ●手指に用いたり、マスク等に吹きかけたりしないでください。 ●1か所に集中してスプレーしないでください。 ●変色、変質などの変化が起きる場合があるため、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装部分等には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお奨めします。 ●子供の手の届くところには置かないでください。 ●缶が錆びるのを防ぐため、水回りや湿気が多いところには置かないでください。